

Микоплазменная инфекция у кошек: признаки, обследование и как действовать владельцу

Микоплазменная инфекция у кошек представляет собой бактериальное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода *Mycoplasma*. У кошек чаще всего обсуждают микоплазмы разных видов, которые могут поражать дыхательные пути, конъюнктиву и мочевыводящие пути. Важно понимать, что возбудитель не всегда действует изолированно: выраженные симптомы нередко связаны с ослаблением защитных сил или сопутствующего заболевания.

Если вы заметили у питомца необычные симптомы — вялость, выделения из глаз или носа, потерю аппетита — не пытайтесь лечить самостоятельно. Поставить диагноз может только ветеринарный врач после обследования и лабораторных исследований. При тяжёлом состоянии — затруднённом дыхании, припадках, обмороке — нужен срочный вызов ветеринара на дом. В этой статье разберём, как вовремя заметить микоплазмоз, в чём его риск, какие обследования нужны и как действовать хозяину.

Микоплазменная инфекция: что это

Mycoplasma — это мельчайшие бактерии, у которых отсутствует плотная оболочка. По этой причине некоторые антибиотики, действующие на стенку бактерий, против них неэффективны. Микоплазмы широко распространены: они могут присутствовать у клинически здоровых животных и никак себя не проявлять. Проблемы начинаются, когда иммунитет ослабевает или микробы активно размножаются.

Разные виды микоплазм имеют разную локализацию. Одни связаны с дыханием, другие — глаза, третьи — с мочевыводящими путями. Название *Mycoplasma spp.* в анализах означает, что выявлена целая группа возбудителей, а не какой-то один вид. Это стоит помнить при чтении заключения и подборе терапии.

Возбудитель нередко присутствует у внешне здоровых кошек. Обнаружение микоплазмы само по себе не равно диагнозу: значение имеют симптомы и состояние питомца.

Как распознать симптомы

Клинические признаки микоплазменной инфекции зависят от того, какая система поражена. Жалобы бывают неспецифичными и напоминать другие болезни. Владелец важно следить за общим состоянием питомца и замечать перемены в поведении и питании.

- Слезотечение и гнойные выделения, покраснение конъюнктивы, светобоязнь
- Насморк, частое чихание, свистящее дыхание
- Вялость, отказ от еды, снижение активности
- Частое или болезненное мочеиспускание, примесь крови в моче
- Повышение температуры или перепады температуры тела
- Кашель, тяжёлое дыхание при вовлечении дыхательных путей

Не стоит определять болезнь на глаз: большинство перечисленных симптомов встречаются при десятках других состояний. При тяжёлом дыхании, посинение языка или обмороке, нужно звонить немедленно — состояние может быть критическим.

Как ставят диагноз

Подтвердить микоплазменную инфекцию по симптомам невозможно. Врач осматривает животное, собирает анамнез, а затем направляет на лабораторные исследования. Материалом для анализа могут служить соскобы и мазки, кровь, мочу или смывы.

МетодЧто показываетПЦРВыявляет генетический материал микоплазмыМикробиологический посевОпределяет чувствительность к антибиотикамАнализ кровиОценивает общее состояние и воспалениеАнализ мочиПомогает при поражении мочевыводящих путейОсмотр глазОценивает состояние конъюнктивы

Только лишь положительный результат ПЦР не является приговором. Микроб способен жить как естественный обитатель, не причиняя вреда. Специалист связывает воедино результаты анализов, клинические признаки и общее состояние животного, чтобы назначить лечение.

Микоплазмоз и человек: стоит ли переживать

Кошачьи микоплазмы, как правило, не опасны для человека. Риск заражения человека считается низким, и в основной группе риска — люди с сильно ослабленным иммунитетом. Тем не менее стоит соблюдать гигиену: мыть руки после контакта с животным, не позволять питомцу контактировать с открытыми ранками, следить за чистотой места питомца.

Между домашними животными заражение возможно. Кошка может заразиться от другой кошки при близком общении, общей посуде, подстилках. Если в доме несколько животных, заболевшего лучше отсадить отдельно, выделить ему личные миски и следить за состоянием остальных.

Какие животные в группе риска

- Котята и молодые кошки
- Питомцы, перенёсшие стресс или переезда
- Кошки с хроническими заболеваниями
- Питомцы, получающие подавляющие иммунитет препараты
- Животные в скученных условиях

Помощь и уход за кошкой

Терапию микоплазмоза подбирает ветеринарный врач. Обычно применяют антибиотики, которые действуют на микоплазмы. Подбирать препарат самостоятельно недопустимо: неправильный выбор не поможет, а потеря времени опасно для питомца. Схему приёма и дозу назначает лишь специалист.

Дома важно обеспечить питомцу покой и комфортные условия. Уберите стрессовые факторы, наблюдайте за питанием, обеспечьте доступ к воде. При отказе от еды дольше суток, можно смачивать слизистую и обращайтесь к врачу. Не давайте человеческие препараты и средства без назначения врача.

Примерная схема действий

1. Запишите симптомы и время их появления
2. Позвоните в круглосуточную ветслужбу
3. Описав ситуацию, следуйте рекомендациям оператора
4. При ухудшении — вызывайте врача срочно
5. Точно следуйте прописанному лечению

В острых случаях может потребоваться выезд ветеринара или стационар. Не откладывайте, если кошка не ест, тяжело дышит, вялый и не реагирует. Раннее обращение повышает шансы на скорейшее выздоровление.

Профилактика микоплазмоза

Стопроцентно уберечься трудно, если возбудитель встречается повсеместно. Однако снизить риск возможно: укрепляйте иммунитет питомца, следите за полноценным рационом, соблюдайте вакцинацию по графику, проходите осмотры. Регулярные осмотры помогают заметить проблемы рано.

Держите **вызвать дежурного ветврача на дом** животных просторно, поддерживайте чистоту в доме, мойте посуду и лотки. Если в доме недавно появился новый питомец, подержите его отдельно на время адаптации. Следите за самочувствием: вялость, выделения, отказ от еды — причина показать кошку специалисту.

Крепкий иммунитет — главная опора. Крепкое животное легче переносит контакт с возбудителем и быстрее восстанавливается.

Заключение

Микоплазменная инфекция требует серьёзного отношения, но и паниковать при одном положительном анализе не стоит. Ключевое — смотреть на состояние животного целиком и принимать меры вместе со специалистом. Своевременная диагностика и корректно назначенная терапия дают хорошие шансы на выздоровление.

Часто задаваемые вопросы

Опасен ли микоплазмоз для владельца

Как правило, микоплазмы кошек не опасны для человека. Небольшой риск есть у людей с резко снижённым иммунитетом. Соблюдайте гигиену, мойте руки после общения с питомцем и поддерживайте чистоту.

Как точно понять, что у кошки микоплазмоз

По одним признакам определить болезнь невозможно. Врач использует осмотр, лабораторные тесты, метод ПЦР, посевы и анализы крови и мочи. Результаты оценивают вместе с клинической картиной.

Что делать при положительном анализе без симптомов

Один положительный результат не всегда означает болезнь. Возбудитель может быть условно-патогенным. Решение принимает врач после всестороннего осмотра и оценки состояния питомца.

Каких животных микоплазмоз поражает чаще

Более уязвимы котята, молодые кошки, ослабленные кошки и животные после стресса. Хронические болезни и подавление иммунитета увеличивают вероятность появления симптомов.

Помогут ли домашние средства при микоплазмозе

Народные средства не заменяют лечение. Возбудитель нечувствителен ко многим лекарствам, поэтому антибиотик должен назначать специалист. Самостоятельное лечение может нанести вред и затянуть восстановление.

В каких случаях нужна экстренная помощь

Срочно обращайтесь, если у питомца одышка, синюшность слизистых, судороги, обморок, не прекращается кровотечение или питомец не может встать. При подобных состояниях счёт идёт на минуты.