

Мycoplasma у кошек: признаки, выявление и что делать

Мycoplasma у кошек — это бактериальное заболевание, которое вызывают микроорганизмы рода Мycoplasma. Обычно они поражают дыхательные пути, слизистую глаз и органы мочевого выделения. Некоторые хозяева сталкиваются с ней неожиданно, когда кошка начинает часто дышать, возникает слабость задних конечностей или моча окрашивается кровью.

Возбудитель способен длительно сохраняться на слизистых без явных симптомов, а патология обостряется при ослаблении защитных сил. Важно понимать, что заключение устанавливает специалист по лабораторным данным, а самолечение опасно для питомца. Если есть подозрение на Мycoplasma стоит пригласить специалиста.

Что такое микоплазмоз у кошек

Микоплазмы — это мельчайшие микроорганизмы, у которых нет жёсткой клеточной стенки. Их обнаруживают на слизистых оболочках органов дыхания, конъюнктивы и мочеполовой системы как у больных, так и у клинически здоровых кошек. Патология возникает не в каждом случае носителей, а когда складываются предпосылки: напряжение, холод, вирусная нагрузка или прочие причины, ослабляющие защитные силы организма.

Мycoplasma-инфекция не обязательно развивается изолированно. Часто он идёт вместе с кальцивирозом, ринотрахеитом или прочими респираторными патологиями. По этой причине ветеринар учитывает не лишь присутствие возбудителя, но и клиническую картину питомца.

Симптомы микоплазмоза у кошек

Признаки заболевания определяются от того, какие органы вовлечены. Когда затронуты органы дыхания, питомец начинает часто дышать, издавать хрипы, чихать или кашлять. При поражении глаз возникают слезотечение, покраснение и слизистые выделения из глаз. Если вовлечены мочевыводящие пути, владелец иногда видит кровь в моче, частые посещения лотка или болезненное мочеотделение.

- Насморк и заложенность
- Воспаление слизистой глаз, слезотечение
- Апатия, снижение аппетита
- Лихорадка — не всегда
- Кровь в моче, поллакиурия
- Нарушение походки, слабость задних лап

Особенно должны насторожить внезапные изменения: питомец отказывается от корма, у неё начинается рвота или понос, возникает тяжёлое дыхание. Если у питомца перестают работать задние конечности или он не встаёт, такое состояние требует неотложной ветеринарной помощи. Не нужно ждать — стоит вызвать врача на дом.

Как диагностируют микоплазмоз

Диагностика микоплазмоза включает несколько этапов. Сначала специалист осматривает питомца, уточняет историю и симптомы. Затем могут быть назначены лабораторные исследования: ПЦР для

выявления ДНК возбудителя, микроскопия мазков или посев на питательные среды. Важно, что положительный результат не всегда означает, что именно этот возбудитель вызвала болезнь — заключение оценивают вместе с симптомами.

МетодНа что направленПолимеразная цепная реакцияПрисутствие генетического материала возбудителяЦитологияВоспалительные измененияБактериологический посевВозможность подбора чувствительности к антибиотикамОбщий анализ кровиВоспалительные измененияБиохимический анализРабота внутренних органов

Лишь ветеринарный врач способен правильно интерпретировать данные и назначить лечение. Не пытайтесь самостоятельно давать противомикробные препараты — это может исказить картину и ухудшить состояние животному.

Как лечат микоплазмоз

Терапия заболевания должно назначаться комплексным и подбираться ветеринаром. Базу часто образуют противомикробные средства, к которым возбудитель восприимчив. Однако не каждый антибиотик работает — ряд могут быть бесполезными из-за отсутствия клеточной оболочки у возбудителя. Именно поэтому выбор препарата должен осуществлять врач.

Дополнительно могут использоваться поддерживающие средства: инфузионная терапия при обезвоживании, средства от температуры (с ограничениями), витаминные комплексы и поддержка иммунитета. Существенно обеспечить питомцу спокойную обстановку, комфортное место отдыха и доступ к воде. Если питомец отказывается кушать, иногда потребоваться насильное кормление или инфузия.

Никогда не стоит давать кошке человеческие препараты без назначения. Некоторые из них могут оказаться ядовитыми для питомцев — например, ацетаминофен и ибупрофен вредны. В любом случае спрашивайте у специалиста, чем разрешено помочь питомцу.

Профилактика и что делать при подозрении

Предупреждение микоплазмоза включает сохранение иммунитета, сбалансированное питание, своевременные осмотры к ветеринару и обработку от паразитов. Стресс, переохлаждение и контакт с больными кошками могут повышать вероятность появления болезни. Когда в доме живёт новый питомец, его нужно показать врачу и если потребуется провести обследование.

1. Изолируйте кошку от прочих животных, когда есть симптомы недомогания
2. Созвонитесь с ветеринарным специалистом и опишите жалобы
3. Не применяйте препараты без назначения
4. Создайте животному покой и свободный доступ к питью
5. Соблюдайте советы врача и не прерывайте терапию самостоятельно

Когда у питомца <https://moiton.ru/dela-semejnye/sovety-i-rekomendatsii/metody-uspokoeniya-zhivotnogo-pered-meditsinskimi-protsedurami> возникли тревожные признаки — одышка, судороги, кровь в моче, отказ задних лап — следует как можно скорее обратиться за поддержкой специалиста. Задержка может вызвать к тяжёлым осложнениям.

Особенности ухода за кошкой при микоплазмозе

Забота за питомцем с микоплазмозом требует создание спокойных условий. Питомцу необходим покой, тёплое место для сна и отсутствие волнений. Когда присутствуют выделения из глаз или носа, их аккуратно убирают ватным диском, смоченным чистой водой или физраствором. Дополнительно важно наблюдать за аппетитом и потреблением воды.

Если кошка не хочет кушать более одного дня, такое состояние может быть опасным. В подобном случае следует сообщить специалисту. Пища должна быть лёгкой и питательной — можно применять особые корма для ослабленных животных или мягкую пищу по рекомендации специалиста.

Заключение

Микоплазмоз у кошек — опасное заболевание, которое нуждается в внимательного отношения и своевременной диагностики. Не стоит практиковать самолечением или откладывать визит к специалисту. Если у питомца появились тревожные признаки, лучше незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью.

Стоит помнить, что правильный уход, поддержка иммунитета и соблюдение рекомендаций врача помогают животному быстрее восстановиться и вернуться к привычной жизни. Мы всегда готовы помочь — обращайтесь.

Часто задаваемые вопросы

Опасен ли микоплазмоз для человека?

Некоторые виды микоплазм способны оказаться патогенными для человека, но кошачьи штаммы, как правило, не передаются человеку. Однако следует соблюдать гигиену: мыть руки после взаимодействия с животным, особенно когда у кошки есть выделения или слизистых.

Можно ли вылечить микоплазмоз у кошки полностью?

Окончательное избавление от микоплазмы не всегда достижимо, так как многие кошки становятся носителями. Однако корректное лечение помогает снять признаки и улучшить качество жизни питомца. Главное — своевременно обратиться к ветеринару и соблюдать назначения.

Когда появляются первые признаки?

Скрытый период может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Признаки могут появиться постепенно или резко, особенно если иммунитет снижен. Иногда патология протекает скрыто.

Можно ли делать прививку от микоплазмоза?

Отдельной вакцины от микоплазмоза на данный момент не существует. Профилактика заключается в поддержке иммунитета, полноценному питанию, регулярным осмотрам у ветеринара и снижению стрессов.

Опасен ли микоплазмоз для других питомцев?

Микоплазмы обладают видоспецифичностью, то есть кошачьи штаммы, как правило, не опасны для собак и других животных. Однако различные виды микоплазм способны поражать разных животных, поэтому при подозрении на инфекцию лучше отделить питомца и проконсультироваться с специалистом.

Какие анализы назначают при подозрении на микоплазмоз?

Как правило ветеринар рекомендует ПЦР (полимеразную цепную реакцию) для обнаружения ДНК возбудителя, цитологическое исследование мазков и, если нужно, бактериологический посев. Дополнительно могут понадобиться общий и биохимический анализы крови для оценки общего состояния питомца. Точный список определяет врач по клинической картине.